

Etat des oiseaux migrateurs et hivernants
Site FR2510046 - Basses vallées du Cotentin et du Bessin - baie des Veys

Nom	Etat de la population	Tendance	Part site/population française	Commentaire état population	Commentaire évolution
Grèbe huppé	⊖	?	0,34 %	effectifs mal connus	
Grand Cormoran	?	?			
Butor étoilé	?	?	0,28 %	effectifs difficiles à évaluer	
Héron garde-bœufs	⊕		4,00 %		
Aigrette garzette	⊕		1,06 %		
Grande aigrette	⊕	↑	1,22 %		
Héron cendré	?	?		effectifs difficiles à évaluer	
Cigogne blanche	⊕		2,50 %	développement récent de l'hivernage ?	pas assez de recul
Ibis falcinelle	⊖		3,50 %	faibles effectifs, occasionnel	
Spatule blanche	⊖		2,70 %	faibles effectifs	
Cygne tuberculé	⊖	?	0,06 %	effectifs mal connus	
Oie rieuse	⊖	↑	7,04 %	faibles effectifs	augmentation, puis absente ces dernières années
Oie cendrée	⊕	↑	2,07 %		
Bernache nonnette	⊕	↑	87,48 %	nouvel hivernant depuis	
Bernache cravant	⊖		0,91 %	faibles effectifs hivernants, forts contingents en transit migratoire	
Tadorne de Belon	⊕		2,28 %		
Canard siffleur	⊕	↑	14,52 %		
Canard chipeau	⊕	↑	1,00 %		
Sarcelle d'hiver	⊕	↑	7,81 %		
Canard colvert	⊕	↑	1,02 %		
Canard pilet	⊕	↑	17,58 %		
Canard souchet	⊕	↑	6,61 %		
Fuligule milouin	⊖	↔	0,19 %	faibles effectifs	stable
Fuligule morillon	⊖	↔	0,11 %	faibles effectifs	fluctuant
Eider à duvet	⊖	?	0,01 %	faibles effectifs, mal connus	développement récent en baie des Veys ?
Macreuse noire	⊖	?	2,39 %	faibles effectifs, mal connus	
Harle huppé	⊖	?	0,40 %	faibles effectifs, mal connus	
Busard des roseaux	⊖	?			
Busard Saint Martin	⊖	?	0,07 %		
Balbusard pêcheur	?	?	0,50 %		
Faucon émerillon	⊖	?	0,05 %		
Faucon pèlerin	⊖	?			
Râle d'eau	?	?			
Gallinule poule d'eau	?	?			
Foulque macroule	⊖	↑	0,37 %		
Huitrier-pie	⊕	↔	7,41 %		fluctuant
Avocette élégante	⊖	?	0,23 %		
Grand gravelot	⊕	↓	2,62 %		
Gravelot à collier interrompu	⊖	↔	2,50 %	faibles effectifs	
Pluvier doré	⊖	?	0,08 %		
Pluvier argenté	⊕	↔	3,84 %		
Vanneau huppé	⊖	?	0,23 %		

Etat des oiseaux migrateurs et hivernants
Site FR2510046 - Basses vallées du Cotentin et du Bessin - baie des Veys

Bécasseau maubèche	☹	?	0,16 %	Surtout présent en migration	
Bécasseau sanderling	☺	↔	4,30 %		fluctuant
Bécasseau variable	☺	↓	3,98 %		
Combattant varié	☹	↔	35,63 %	petite pop hivernant marginal FR	fluctuant
Bécassine sourde	?	?		effectifs difficiles à évaluer	
Bécassine des marais	?	?		effectifs difficiles à évaluer	
Barge à queue noire	☹	↑	0,87 %	faibles effectifs	
Barge rousse	☺	↔	5,23 %		fluctuant
Courlis cendré	☺	↔	20,27 %	fort rôle refuge en cas de froid	
Chevalier arlequin	☹	↔	2,60 %	faibles effectifs	
Chevalier gambette	☺	↔	4,22 %	faibles effectifs	fluctuant
Tourneperre à collier	☺	↔	2,34 %		
Mouette mélanocéphale	?	?			
Mouette rieuse	?	?			
Goéland cendré	?	?			
Goéland argenté	?	?			
Goéland marin	?	?			
Sterne caugek	?	?	0,39 %	effectifs mal connus	
Sterne pierregarin	?	?		effectifs mal connus	
Sterne naine	?	?	0,74 %	effectifs mal connus	
Guifette moustac	?	?	0,04 %		
Guifette noire	?	?			
Hibou des marais	☹	?	0,60 %	effectifs mal connus	
Martin-pêcheur	?	?			
Alouette haussecol	☹	?		faibles effectifs	
Pipit farlouse	?	?			
Pipit spioncelle	?	?			
Phragmite aquatique	☹	↓	0,14% (part site/pop européenne)	effectifs moindres / autres sites français	
Bruant des neiges	☹	?	0,86 %	faibles effectifs	

☺	population abondante : >1 % pop française
☹	population abondante : < 1 % pop française ou ☺ mais occasionnelle ou faible effectif absolu
☹	☹ mais occasionnelle ou faible effectif absolu